

Prélèvements génitaux chez la femme

Syndrome clinique	Localisation de l'infection	Echantillon(s) à prélever
<u>Bartholinite</u>	Glande de Bartholin	<ul style="list-style-type: none"> • Produit d'aspiration de la glande • Ecouvillonnage du pus/de l'abcès
<u>Cervicite</u>	Canal endocervical	<ul style="list-style-type: none"> • Ecouvillonnage endocervical
<u>Endométrite</u>	Endomètre	<ul style="list-style-type: none"> • Aspiration transvaginale de l'endomètre • Biopsie de l'endomètre
<u>Salpingite (PID – maladie inflammatoire pelvienne)</u>	Infection ascendante des trompes de fallope et de la cavité péritonéale	<ul style="list-style-type: none"> • Culdocentèse (ponction guidée par échographie à travers le cul de sac vaginal postérieur) • Echantillon d'abcès pelvien obtenu par laparoscopie
<u>Skénite</u>	Glande de Skène	<ul style="list-style-type: none"> • Produit d'aspiration de la glande • Ecouvillonnage du pus/de l'abcès
<u>Urétrite</u>	Urètre	<ul style="list-style-type: none"> • Ecouvillonnage urétral (eSwab® orange) => culture aérobie • Ecouvillonnage urétral (écouvillon Multi-Collect®) => PCR Gono/Chlamydia • Urine premier-jet
<u>Vaginose</u>	Vagin	<ul style="list-style-type: none"> • Ecouvillonnage des sécrétions de l'orifice vaginal et de la voûte vaginale postérieure
<u>Vulvo-vaginite</u>	Vagin, vulve	<ul style="list-style-type: none"> • Ecouvillonnage des sécrétions de l'orifice vaginal et de la voûte vaginale postérieure • Ecouvillonnage de la vulve
<u>Dépistage du portage de <i>Streptococcus agalactiae</i> (GBS)</u>		<ul style="list-style-type: none"> • Ecouvillonnage vagino-rectal (avec le même écouvillon !) à 35-37 semaines d'aménorrhée

Cas particuliers des prélèvements associés aux infections intra partum, post partum et post abortum

Syndrome clinique	Localisation de l'infection	Echantillon(s) à prélever
<u>Syndrome d'infection intra-amniotique</u>	Utérus, liquide amniotique, membrane amniotique	<ul style="list-style-type: none"> • Liquide amniotique • Tissus amniotique • Hémocultures
<u>Endométrite, endomyométrite, endoparamétrite du post partum</u>	Endomètre et muscle utérin	<ul style="list-style-type: none"> • Aspiration transvaginale de l'endomètre • Biopsie de l'endomètre • Hémocultures
<u>Sepsis puerpéral/ Avortement septique</u>	Endomètre, muscle utérin, pelvis	<ul style="list-style-type: none"> • Aspiration transvaginale de l'endomètre • Biopsie de l'endomètre • Hémocultures
<u>Thrombophlébite pelvienne septique</u>	Veines pelviennes profondes	<ul style="list-style-type: none"> • Hémocultures