


Procédure de prélèvement de l'urine mi-jet chez la FEMME, patiente « ambulante ».

MATERIEL : Pot stérile pour urines (Bactériologie)
Set de lingettes ou gant de toilette propre



TECHNIQUE :


- 1) Se **laver** les mains à l'eau et au savon.
Ouvrir le pot **SANS** toucher l'intérieur du pot, ni l'intérieur du couvercle. Poser le couvercle canule vers le haut, sans toucher la canule, sur une surface propre.
Préparer la lingette nettoyante ou le gant de toilette.



- 2) Réaliser une toilette soignée de la région **vulvaire** :
D'une main, écarter les grandes et les petites lèvres pour dégager le méat urinaire. Nettoyer avec la lingette (ou un gant de toilette avec du savon, puis rincer à l'eau claire).



- 3) En maintenant les lèvres écartées, éliminer le premier jet d'urine dans la cuvette des WC.
- 4) Interrompre la miction, recueillir le second jet d'urine dans le **pot stérile** fourni par le laboratoire **SANS** toucher l'intérieur du pot avec les doigts (au moins 20 ml d'urine).



- 5) Fermer hermétiquement le pot, **SANS** toucher l'intérieur du pot ni l'intérieur du couvercle et la canule, avec les doigts.
Se laver les mains.
Identifier le pot avec les NOM et prénom.
Faire parvenir rapidement (endéans les 2 heures) l'échantillon avec la prescription au laboratoire.
Si le délai d'acheminement au laboratoire est supérieur à 2 heures, conserver au frigo (4°C- 8°C).

